

Guide pour l'utilisation de Bluem avant et après la pose d'implants

En pré-op: donnez les informations à votre patient et appliquez selon les instructions suivantes :

- Démarrez **15 jours avant l'intervention** l'utilisation du bain de bouche Bluem pendant 1 à 2 minutes par jour. (Pour mettre la gencive en condition de façon optimale)
- Après implantation: mettre un peu de gel Bluem dans une seringue jetable de 2,5 ml (Terumo par ex.), visser la pointe noire (Ultradent). Appliquer le gel sur la plaie suturée autour de l'implant.

En post-op: donnez les informations à votre patient et appliquez selon les instructions suivantes :

- **Semaine 1:** démarrez le soin 24 heures après la chirurgie en rinçant la bouche avec le bain de bouche Bluem. Répétez 4 fois par jour le traitement (pendant une minute) pendant une semaine, après les repas. Brossez les dents avec le dentifrice Bluem le 1er jour suivant l'intervention, très doucement en prenant soin de ne pas irriter la zone chirurgicale. Utilisez une brosse à dent souple.
- **Semaine 2:** rincez 3 x par jour (pendant une minute) avec le bain de bouche Bluem. 2 x par jour brossez les dents avec le dentifrice Bluem avec une brosse à dent souple.
- **Après 2 semaines:** Vous pouvez également broser doucement le site chirurgical avec le dentifrice Bluem. S'il y a des piliers de cicatrisation sur vos implants, qui émergent à travers la gencive, il faudrait les broser régulièrement et les maintenir propres et sans plaque. 2 x par jour rincez avec le bain de bouche Bluem.



Pour plus d'informations:

www.bluemcare.com et www.proparo.fr

Distribué par: 5 Pillars Research B.V.
Arnhem NL Made in the Netherlands
En France: Proparo SAS, Paris